

Vos questions / nos réponses

héroïne et méthadone

Par [Profil supprimé](#) Postée le 29/07/2010 04:40

Bonjour

Dans votre réponse apporté à Doudou 21 vous dites que la prise d'héroïne et de subutex n'a aucun intérêt pour le consommateur ...Pouvez-vous me dire s'il en est de même pour la méthadone ???

Je suis convaincue que mon fils prend certains jours de l'héroïne et sa méthadone ...Bref je vous serai reconnaissante de m'apporter des informations à ce sujet.

Merci

Mise en ligne le 29/07/2010

Bonjour,

La méthadone est un médicament de substitution aux opiacés. Le principe actif de ce médicament est une molécule proche de celle de l'héroïne dont la durée d'action est plus longue (24h). Cette molécule vient "remplacer" celle de l'héroïne au niveau des récepteurs du cerveau et permet ainsi de ne pas ressentir de sensation de manque en l'absence de prise d'héroïne. Sur le plan de ses effets, la méthadone n'entraîne pas d'effet euphorisant et diminue l'envie de consommer de l'héroïne.

Concernant la prise concomitante de méthadone et d'héroïne, il existe des différences avec la buprénorphine haut dosage (subutex). En effet, si l'on prend de l'héroïne après avoir pris de la méthadone, les récepteurs étant déjà occupés par le médicament, il n'y aura pas de sensation de plaisir. En revanche, si l'on prend de la méthadone après avoir pris de l'héroïne il existe un risque de surdosage.

Toutefois certaines personnes sous méthadone poursuivent leurs consommations d'héroïne, généralement en ne prenant pas ou qu'une partie de leur traitement lorsqu'elles ont l'intention de consommer.

Ces consommations concomitantes peuvent également être dues à un sous-dosage du médicament obligeant la personne à avoir recourt au produit pour éviter le manque.

Ce qui est important à retenir est que le parcours de soin est loin d'être linéaire et que la seule prise d'un traitement de substitution peut ne pas suffire à ce que la personne cesse ses consommations. Le produit à pris une place importante dans sa vie, une fonction particulière qu'un médicament ne peut compenser complètement. D'où l'intérêt d'un suivi au long court en centre de soin comme cela doit être le cas de votre fils.

Nous poursuivons notre propos dans la réponse à votre seconde question.

Cordialement.

